

必ずお読みください！

《 検査が終わったら 》

◎すぐに下剤2錠をコップ2杯以上の水で服用してください。

《その後の注意》

1. 白っぽい便（バリウム）が出て、日頃の便に戻るまでは、多めに水分をとってください。
2. 食事は、すぐにとってもかまいません。バリウム排出に効果的です。
3. 8時間以内に白っぽい便が出ない場合はもう2錠服用してください。
4. 翌朝までに白っぽい便がまったく出なかった場合は、医療機関にご相談ください。

《下剤について》

- 検査のために服用したバリウムは、体内に長く貯留すると水分が吸収され、硬い固まりとなり、まれに腸閉塞や腸穿孔を起こすことがあります。下剤を服用し、多めの水分を摂取することで、早くバリウム便を排泄することが必要です
- お渡しした下剤（センナリド錠）は、大腸を刺激することで、大腸の動きを活発にし排便を促していきます。まれにですが、悪心・嘔吐、激しい腹痛などの症状を起こすことがあります。このような症状が現れた場合は、早めに医療機関を受診してください。
- 下剤の効き方には個人差があります。常用されている下剤は飲んでいただいてもかまいませんが効きすぎる場合もあります。ご注意ください。

《アレルギー症状について》

バリウムを飲んだ後、まれに重篤なアレルギーを起こすことがあります。

じんましん、気分が悪い、顔色が青白くなる、手足が冷たくなる、喉がつまる、息苦しい、息がしにくいなどの症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診し、適切な処置を受けてください。

《 検診結果について 》

検診結果はおよそ1か月後になります。精密検査が必要となった場合には、あなたが希望した医療機関に当協会から紹介（予約）を行います。その際、あなたの検診結果と所見を送付していますので、精密検査を必ずお受けください。

精密検査には、口又は鼻からカメラを挿入し、食道、胃、十二指腸を調べる上部消化管内視鏡検査があります。

お問い合わせ先：公益財団法人香川県総合健診協会

検診課：TEL(087)870-5505

裏面もお読みください